

Index thérapeutique

Vous trouverez ci-dessous un index thérapeutique reprenant les molécules et classes thérapeutiques citées dans les articles de ce numéro, avec pour chaque molécule (s) les noms commerciaux correspondant, ainsi que les dosages et présentations disponibles en Algérie.

Sauf erreur ou omission bien involontaire de notre part, nous pensons avoir été exhaustif, mais si ce n'était pas le cas, merci d'avoir l'amabilité de nous le signaler à l'adresse suivante : redaction@el-hakim.net

Toxine Botulique :

Dénomination commune internationale	Nom de marque	Forme	Dosage
Toxine botulinique type a : complexe toxine - hemaglutinine bo tx-a	Dysport 500 unités Speywood [®]	poudre pour solution injectable	500 UI Speywood (Une Unité Speywood correspond à DL 50 chez la souris par voie intra péritonéale)

Les anticholinergiques

Dénomination commune internationale	Nom de marque	Forme	Dosage
Trihexyphenidyle chlorhydrate	Parkidyl [®]	comprimé sécable	5 mg
Trihexyphenidyle chlorhydrate	Parkidyl [®]	comprimé sécable	2 mg
Trihexyphenidyle chlorhydrate	Sowel [®]	comprimé	5 mg
Trihexyphenidyle chlorhydrate	Sowel [®]	comprimé	2 mg
Trihexyphenidyle	Parkinane [®] LP	gélule LP	2 mg
Trihexyphenidyle	Parkinane [®] LP	gélule LP	5 mg

Les myorelaxants agonistes du GABA

Dénomination commune internationale	Nom de marque	Forme	Dosage
Baclofene	Bacro [®]	comprimé	10 mg
Baclofene	Lioresal [®]	comprimé sécable	10 mg
Baclofene	Baclon [®]	comprimé sécable	10 mg

Les benzodiazépines

Dénomination commune internationale	Nom de marque	Forme	Dosage
Clonazepam	Novatril [®]	comprimé	2 mg
Clonazepam	Rivomed [®]	comprimé quadrisécable	2 mg
Clonazepam	Clona [®]	comprimé	2 mg
Clonazepam	Clona [®]	solution buvable en gouttes	2,5 mg/ml

Antiparkinsonien

Dénomination commune internationale	Nom de marque	Forme	Dosage
Levodopa/carbidopa	Levomed [®]	comprimé	100 mg/10 mg
Levodopa/carbidopa	Levomed [®]	comprimé	250 mg/25 mg
Levodopa/carbidopa	Levocarb [®]	comprimé sécable	250 mg/25 mg

Traitement enzymatique substitutif (TES)

Dénomination commune internationale	Nom de marque	Forme	Dosage
Alglucosidase alfa	Myozyme [®]	poudre pour solution à diluer pour perfusion IV	50 mg/flacon après reconstitution 5 mg/ml d'alglucosidase alfa, après la dilution la concentration varie de 0,5 à 4 mg/ml